

KARDİYOMİYOPATİLİ KEDİLERDE ERİTROSİT MORFOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim GEMALMAZ

ORCID 0009-0000-8011-0450

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

MEZUNİYET TARİHİ: 24.07.2026

DANIŞMAN

DOÇ. DR. İ. Taci CANGÜL

ORCID 0000-0003-0537-2113

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VETERİNER FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

BURSA – TÜRKİYE

TEZ ÖZETİ

Kedilerde kardiyomiyopatiler, ciddi hemodinamik bozukluklara ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilen primer miyokard hastalıklarıdır. Bu çalışmada, kardiyomiyopatili kedilerde eritrosit morfolojik değişiklikleri ile bu değişikliklerin ekokardiyografik parametreler ve NT-proBNP düzeyleriyle ilişkisi araştırıldı.

Çalışmaya 10 sağlıklı ve 10 kardiyomiyopatili olmak üzere toplam 20 kedi dahil edildi. Tüm olgularda klinik muayene, toraks radyografisi, elektrokardiyografi, transtorasik ekokardiyografi, hematolojik ve biyokimyasal analizler ile serum NT-proBNP ölçümleri yapıldı; periferik kan frotileri değerlendirildi. Kardiyomiyopatili kedilerde poikilositoz, özellikle şistosit, keratosit ve eksentrosit benzeri hücrelerin daha sık görüldüğü, bazı morfolojik değişikliklerin ekokardiyografik bulgular ve NT-proBNP ile ilişkili olduğu belirlendi.

AKADEMİK FAALİYETLER

Ankara International Congress on Scientific Research-XIII makale sunumu.



ANAHTAR KELİMELER

- ✓ Kedi
- ✓ Kardiyomiyopati
- ✓ Eritrosit Morfolojisi
- ✓ Ekokardiyografi
- ✓ NT-proBNP

İLETİŞİM

E-POSTA:
ibrahimgemalmaz@gmail.com

TEZ DANIŞMANI

TELEFON:
05366994309

E-POSTA:
itcangul@uludag.edu.tr

