

BRONKOSKOPI OLACAK HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

İŞLEM ÖNCESİNDE:

HASTA:

- KULLANDIĞI İLAÇLARI VARSA İŞLEM ÖNCESİ MUTLAKA EKİP ÜYELERİNE DETAYLI BİLGİ VERMELİDİR.
- KRONİK HASTALIKLARI SORGULANMALI, VARSA BİLGİ VERMELİDİR.
- DİYABET (ŞEKER) HASTALIĞI VARSA İNSÜLİN VEYA ŞEKER İLAÇLARINI DOKTORUN ÖNERDİĞİ ŞEKİLDE KULLANMALIDIR.
- EPİLEPSİ, YÜKSEK TANSİYON VEYA KALP HASTALIĞI GİBİ ÖNEMLİ BİR HASTALIĞI VARSA İLAÇLARINI NORMAL ALDIĞI SAATİNDE ÇOK AZ BİR MİKTAR SU İLE ALMALIDIR.
- ANTİKUAGÜLAN(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIYORSA DOKTORA BİLGİ VERMELİ, DOKTORUN ÖNERDİĞİ ŞEKİLDE KULLANMASI GEREKMEKTEDİR.
- İŞLEM ÖNCESİ EN AZ 6-8 SAAT AÇ KALINMASI GEREKMEKTEDİR.
- İLAÇ VEYA DİĞER HERHANGİ BİR FAKTÖRE BAĞLI ALERJİSİ VARSA BİLGİ VERMELİDİR.
- HASTA İŞLEME GELMEDEN ÖNCE AĞIZ İÇİ TEMİZLİĞİ VE ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA AĞIZ BAKIMI YAPMASI ÖNERİLMEKTEDİR.
- TAKMA DİŞİ, İŞİTME CİHAZI, KONTAK LENS VEYA VUCÜDUNDA DEĞERLİ EŞYA , TAKI BULUNDURMAMASI GEREKMEKTEDİR.
- HASTANIN YANINDA BİR REFAKATÇİ BULUNMALIDIR.

SONRASINDA:

- İŞLEM LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILMIŞSA SONRASINDA ANESTEZİYE BAĞLI OLARAK BOĞAZ VE GIRTLAĞTA 2-3 SAAT HİS KAYBI OLABİLİR.
- GEÇİCİ OLARAK BOĞAZ AĞRISI VE YUTMA GÜÇLÜĞÜ OLABİLİR.
- LOKAL ANESTEZİ İLE YAPILAN İŞLEM SONRASINDA 2-3 SAAT AĞIZDAN SU DAHİL HERHANGİ BİR ŞEY YİYİP İÇİLMEYELİDİR.
- EĞER GENEL ANESTEZİ İLE YAPILMIŞSA EN AZ 4 SAAT AĞIZDAN HERHANGİ BİR ŞEY ALINMAMALIDIR.
- ÖKSÜRÜRKEN GEÇİCİ OLARAK HAFİF KANAMA OLMASI NORMALDİR.
- BULANTI KUSMA HİSSİ OLABİLİR. NORMAL VE GEÇİCİDİR.
- İŞLEME BAĞLI GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK, GÖĞÜS VE SIRT AĞRISI, NEFES DARLIĞI, KANAMA GİBİ DEVAM EDEN VE RAHATSIZ EDEN ŞİKAYETLER OLURSA YAKIN BİR SAĞLIK KURULUŞUNA VEYA UÜ SUAM OLARAK KURUMUMUZA BAŞVURU YAPILABİLİR.
- İŞLEM SONRASINDA SONUÇLARIN TAKİP EDİLMELİ, BİLGİ VERİLEN GÜN VE TARİH ARALIĞINDA KONTROL RANDEVUSU ALINMALIDIR.